

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**第2類医薬品** 芳香性健胃消化薬 **太田胃散s**

**⚠ 使用上の注意**

- ❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人。2. 長期連用しないでください
- ⚠ 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■**効能・効果** 飲みすぎ、胸やけ、胃部不快感、胃

弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、消化不良、消化促進、食欲不

振、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪

酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重 ■**用法・用量** 成人

(15歳以上) 1回1.3g、8～14歳 1回0.65g、1日3回食後又は食間に水又は

ぬるま湯で服用してください。8歳未満は服用しないでください。(添付のさじはす

り切り1杯で約1.3gです。中ふた裏のすり切り板をご使用ください。食間とは食後

2～3時間のことをいいます。) <用法・用量に関連する注意> 小児に服用させる場合

には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。■**成分** 1日量(3.9g)中ケイヒ

276mg、ウイキョウ72mg、ニクズク60mg、チョウジ36mg、チンピ66mg、ゲンチアナ45mg、ニガキ末

45mg、炭酸水素ナトリウム1,875mg、沈降炭酸カルシウム980mg、合成ヒドロタルサイト300mg、

ピオチアスターゼ135mg [添加物] l-メントール、炭酸Mg ■**保管及び取扱い上の注意**

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えない

でください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

<製品のお問い合わせ先> お客様相談室 ☎(03)3944-1311

受付時間9:30～17:00(土、日、祝日等を除く)

製造販売元 **株式会社 太田胃散**  
東京都文京区千石2-3-2