

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

一かぜ薬一

ジキニン[®]C錠

第2類医薬品

販売名：ジキニンC錠

- アセトアミノフェンをはじめ、8つの有効成分がかぜの諸症状（せき、発熱、頭痛、鼻水、鼻づまりなど）を緩和します。
- かぜの回復を助けるビタミンCを最大量500mg※配合したかぜ薬です。
※一般用かぜ薬製造販売承認基準の最大量配合／アスコルビン酸カルシウムとして

【使用上の注意】

！

してはいけないこと

⊗

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3)12才未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがある。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 服用前後は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。

相談すること

👤

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

〔表面からのつづき〕

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【**効能・効果**】

かぜの諸症状（せき、発熱、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【**用法・用量**】 次の量を食後なるべく 30 分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠 	3 回
12才以上 15才未満	2錠 	
12才未満	服用しないこと	

〈**用法・用量に関連する注意**〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

(3) 錠剤の取り出し方
- 錠剤の入っているPTPシートの凸部分を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。）
- 

【**成分**】（9錠中）

成 分	分 量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	24 mg	咳中枢に働き、せきを鎮めます。
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支を拡張し、せきを鎮めます。
カンゾウ（甘草）エキス粉末	121.6 mg （原生薬換算量 950 mg）	炎症を抑え、せき、たんを緩和します。
アセトアミノフェン	900 mg	発熱やのどの痛みを緩和します。
<i>d</i> -クロルフェニラミン マレイン酸塩	3.5 mg	鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状を抑えます。
無水カフェイン	75 mg	頭痛を緩和します。
アスコルビン酸カルシウム （ビタミンCカルシウム塩）	500 mg	かぜの回復を助けます。
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12 mg	かぜのときに消耗しやすいビタミンを補います。

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、黄色4号（タートラジン）、アセスルファム K、クロスカルメロース Na、酸化チタン、ステアリン酸 Mg、セルロース、ヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有します。

〈**成分に関連する注意**〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビン（ビタミンB₂）によるものですので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬お客様相談室
- 電 話：03 (4476) 8030
- 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<https://www.zenyaku.co.jp>